

## Grundbegriffe der Mengenlehre

Definition von *Georg Cantor (1845 – 1918)*: „Eine *Menge* ist eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens (genannt die *Elemente* der Menge) zu einem Ganzen.“

Man kann eine Menge *beschreiben* oder ihre Elemente *aufzählen* (in geschwungenen Klammern { }, die Reihenfolge ist dabei egal).

Beispiele:

Ö = Menge aller österreichischen Bundesländer

Ö = {Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien}

A = { $x \in \mathbb{N} / x \leq 7$ } ... Menge aller natürlichen Zahlen kleiner oder gleich 7

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}





B = { $x \in \mathbb{N}_g / 4 \leq x \leq 12$ } ... Menge aller geraden Zahlen zwischen 4 und 12

B = {4, 6, 8, 10, 12}

Wichtige Begriffe und Zeichen:

$\in$	Element	in obigem Beispiel: Salzburg $\in$ Ö, Bayern $\notin$ Ö $3 \in A$ , $3 \notin B$
{ }	leere Menge	Menge die keine Elemente enthält z.B.: Menge aller bisherigen Kaiser der USA { $x \in \mathbb{N} / x < 0$ }
$\subseteq$	Teilmenge	Menge, die ganz in einer anderen enthalten ist in obigem Beispiel: $T = \{1, 2, 3\} \subseteq A$
$A \cap B$	Durchschnitt	alle Elemente, die in A <i>und</i> B enthalten sind $A \cap B = \{x / (x \in A) \text{ und } (x \in B)\}$ in obigem Beispiel: $A \cap B = \{4, 6\}$
$A \cup B$	Vereinigung	alle Elemente, die in A <i>oder</i> B enthalten sind $A \cup B = \{x / (x \in A) \text{ oder } (x \in B)\}$ in obigem Beispiel: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12\}$
$A \setminus B$	Differenzmenge	alle Elemente von A, die <i>nicht</i> in B enthalten sind $A \setminus B = \{x / (x \in A) \text{ und } (x \notin B)\}$ in obigem Bsp.: $A \setminus B = \{1, 2, 3, 5, 7\}$ , $B \setminus A = \{8, 10, 12\}$

Darstellung durch Mengendiagramme:




Eine Teilmenge von  $\mathbb{R}$  in der Art von

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 5\}$$

kann man nicht mehr aufzählen. Solche Mengen bezeichnet man als *Intervalle*; man schreibt auch

$$I = [2, 5]$$

Darstellung auf der Zahlengeraden:



$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	<i>abgeschlossenes Intervall</i> (Endpunkte gehören dazu)
$]a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	<i>offenes Intervall</i> (Endpunkte gehören nicht dazu) andere Schreibweise: $(a, b)$
$[a, \infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	<i>unbeschränktes Intervall</i> (da $\infty$ keine Zahl ist, ist dieses Intervall rechts offen!)